Alicante blanc (par erreur)

Vass8R01s181-185

Collection Vassal-Montpellier

dentenherredentenherred

Lustruluntindostudos tesdos t

0Mtp16

FH

Ricarle Carre Carre

Alicante blanc 8 R1 s 181-185





CLOS & RANG 1 Souche 181-185

Désignation: Alicante blanc

CHARGE: Année:

Véraison: 4.8

Maturité: 5-9.88

Mill:: Pour.: Pour.: Pour.: Vigueur: Pour.: Pour.: Pour.: Pour.: Vigueur: Port: érig - 172 érig - couché

BAIE: Année:

TG - G - M - P - Dim. Mox M

disc - Sph. (ell) -ov. -obov. -cyl. -fus.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N,

SAVEUR: Pour.: Pour. - pépins - apyrène

SX JUS inc. - coloré

SX JUS inc. - coloré

dartin hatadratadaniad

Augundantiaileateoloob

ANNEE 1988

Juntumburti <mark>minutusi</mark>mitani

NOM Alicante blane EMPLACEMENT 8 Rt 1 181-185

donton horanda ataula ataul

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	F1 début	oraisc mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
1 × × ×	5	安243	28.3	1	2	315	36	66	4.8	8.8	12.8	5.9.88
	P	ourritu	#4 0	Po	ort : Con	evgi ai	3,6 +3 Vigue	eur :	2 faible	+3		+3

1989 ANNEE

MOM

Alicante blanc EMPLACEMENT 8 Rs 5181-185

Débourrement Nbre début mi/déb grap Souche yeux Ferti-Floraison début mi/f fin Véraison début mi/v fin Maturité 203. 0 163 1 X 78. ¥ 5/ Viqueur :

1990 ANNEE Alicante ble EN Nou EMPLACEMENT 8 R1 & 181. 185 NOM Floraison Véraison début mi/v fin Débourrement début mi/déb Nbre Nbre Ferti-Souche yeux grap lité Maturité 2 % très parache

luntum lunti<mark>ndomina</mark> plantanlantanlantanlantan)

Nº d'ordre :

Lesignation :

Emplacement :

Alicante blanc cl 8 Rs 181.185 s. 1

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui (82) - moyen 183 - globuleux 184.

Clabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux (90) - sans villosité pubescente (7) - sans villosité laineuse 279.

Hlanc 101) - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé (94 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196. - entièrement bronzé on cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Utalégs - en gouttière - autres.

cace inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pobescente (86) - saus villosité laineuse 281.

Pace supérieure : planches 2031 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 -2 lisără carmină 208 - jaune 209 - à plages byonzées ou cuivrées 210 chalèrement bronzées ou caivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la premuère feuille détachée est à liséré carminé, 44 couleur de la 2ºme et do la 3ême reuille détachées sera notée).

(E) JEUWES FEUILLES DU BAS

s ce intérioure

acrures : glabra 214 - séteux (29 - velouté 216 - aranéeux 217 duvereux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 eans villosité laineuge 283.

Limbs : glabro 229 - séteux 221 - valouté 222 - aranéeux 223 duveteux 20 - cotonneux 225 - sans vill@site pubescente 284 sars villosité laineuse 285.

A limbe glan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Pace supériaure

Blanc 225 · fauve on roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - 8 plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou Juivrées 232 - verte (33/Janue

A potable glabro 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duvatoux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laincuse 287.

Totalement - sillon - partiel(sment.

Calvo 88

Alicante blane 8 R 1 s, 181-185 s, 1 (un fen faible)

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

duutuuluuti**a**i

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvoso

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement :

Alicante blane 8 R 1 s - 181-185 (6,1)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147) - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 163 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-

ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163) - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement

rouge 166. Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

Long 170 - moyen 171 - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo 88

Alicante blanc

8 R 1 s - 181-185 s.1

(Jarde mylle en 13) N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions: x). Läche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73. A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76. A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Ame de la rafle coloré 80 - non coloré 81. BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 46 ×16). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91). Près pruinée 02 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulaire - irrégulière. Forme: discoïde 95 - sphéroïde 66 ellipsoïde 90 ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. 4 jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. à section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (11).

A saveur neutre (12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facille (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte (25 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bournelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

hodonloob

-Calvo 93

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année

Code clone

Code cepage -

Nom cepage Alicante blane

Observateur + D

Emplacement: 8 Res 171 185

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique B- aplatie 5

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre Ø- rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles absentes Ø - présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence () - présence ()

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds absence () - présence ()

oiv 353 longueur entrenoeuds : très courts (-60mm) 🕜 courts (90mm) 🖖 moyens (120mm) 5

longs (150mm) 7 - tres longs (>180mm) 9

oiv 354 diamètre entrenoeuds : très petit (5mm) 1 petit (8mm) & moyen (11mm) 5 - grand

(14mm) 7 - tres grand (-17mm) 9

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha : tres faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - tres élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 faible 3 « moyen 5 » elecé 7 » très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse très faible 1 - faible 3 - moyen 5 éleve très élevé 9

Vassal

Noeuds : aplatis 1 movens 2 - saillants 3

351-3 352-3

N° d'ordre : Désignation : Alicante blanc Emplacement : 8 R / A 181. 185

limituuluuti<mark>arhuutaadaa</mark>

```
3 (1)-(2) - 3
Angle des nervures
                                                     : 4 - 5 - 6
 Sexe
                                                     : (7)-(8)-9
L_1/L_2
                                                     : (10) - (11)
L2/L
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20

Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                       : (267)
 Sinus pétiolaire ouvert
 Dent au fond du sinus pétiolaire : (30)
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38-39

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
                                                     : (40) - (41)
 Dents : forme
                                                     : 42 - (43) - (44)
 Dents (angle)
                                        : 45 - (46) - 47
 Angle du lobe terminal
 Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90